

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව / இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் / Department of Examinations, Sri Lanka

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 1995 අගෝස්තු සංස්ථිත බොහෝම තරාතරාපත්තිර(ඔ.ආ. තරා) පරීட்சණ, 1995 ඉක්බිති General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 1995			
ව්‍යවහාරික ගණිතය II பிரமுகக் கணிதம் II APPLIED MATHEMATICS II	02 <table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>S</td> <td>II</td> </tr> </table>	S	II
S	II		
පැ තුනයි / පැත්තු மணி / Three hours			

ප්‍රශ්න හයකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.

අවශ්‍ය තත්වී ගුරුත්වජ ත්වරණය, $g = 10 \text{ m s}^{-2}$ ලෙස ගන්න.

1. (අ) Oxy - තලයේ වූ චක්‍රයක් කෙසේ ද යත් $P = (x, y)$ ලක්ෂ්‍යයේ දී අභිලම්භයේ P හි x - අක්ෂයක් අතර කොටසේ දිග, අභිලම්භයේ x - අක්ෂය ඔස්සේට සමාන වන පරිදි ය. P ලක්ෂ්‍යයේ දී චක්‍රයේ අනුක්‍රමණය

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y^2 - x^2}{2xy}$$

යන්නෙන් ලැබෙන බව පෙන්වන්න. චක්‍රය, $(1, 1)$ ලක්ෂ්‍යය හරහා යන බව ද සිංබෙන විට චක්‍රයේ සමීකරණය කොට චක්‍රයේ දළ සටහන අඳින්න.

- (ආ) පැලෑටියක $h(t)$ උස t කාලය සමඟ පැයට $k\%$ ක සීඝ්‍රතාවයකින් සන්තතික ලෙස වැඩි වෙයි. පැය 100 n ක දී උස දෙගුණයක් වෙයි නම්

$$k = \frac{1}{n} \log_e 2$$

බව පෙන්වන්න.

2. වැනි රථයක්, A නගරයේ සිට B නගරය වෙත සෘජු ප්‍රධාන මාර්ගයක් ඔස්සේ ගමන් කරයි. $t = 0$ වේලාවේ දී A හි සිට නිශ්චලතාවෙන් ගමන් අරඹන වැනි රථය, එහි $2u$ උපරිම වේගය ලබා ගැනීමට f නියත ත්වරණයෙන් චලනය වෙයි. $t = \frac{u}{2f}$ විට වැනි රථය A හි B හි අතර වූ C හි දී රථවාහන පොලීස් රථයක් පසු කරයි. ඒ හාම වැනි රථය දකින පොලීස් වෛද්‍යරා, සවිත් $\frac{u}{2f}$ වේලාවකට පසු C හි සිට නිශ්චලතාවෙන් ගමන් අරඹා හැකි ඉක්මනින් වැනි රථය අල්ලා ගැනීම පිණිස $2f$ නියත ත්වරණයෙන් පොලීස් රථය පදවයි. $t_0 (> 0)$ කාලයක් පුරා එහි උපරිම වේගය පවත්වා ගැනීමෙන් පසු වැනි රථය, B හි දී නිශ්චලතාවට එළඹෙන්නේ $2f$ නියත මන්දනයක් යටතේ ය. වැනි රථය පසු කරන කොටසේ පවත්වා ගනු ලබන පොලීස් රථයේ උපරිම වේගය $3u$ නම්, වැනි රථයේ පොලීස් රථයේ වලිකය සඳහා ප්‍රවේග කාල චක්‍ර එකම රූප සටහනක අඳින්න. ඒ නමින්, $t_0 \geq \frac{2u}{8f}$ නම් ඒවායේ උපරිම වේග සිංබෙන අතරතුර දී පොලීස් රථයට වැනි රථය පසු කර යාමට හැකි බව පෙන්වන්න.

$t_0 < \frac{2u}{8f}$ නම් ද, $0 < t_1 < \frac{u}{f}$ වන සේ $t = \frac{2u}{f} + t_0 + t_1$ විට පොලීස් රථය වැනි රථය පසු කරයි නම් ද

$$t_1 = \left(\frac{11u^2 - 8ft_0}{8f^2} \right)^{\frac{1}{2}} - \frac{u}{2f}$$

බව පෙන්වන්න.

3. ගුරුත්වයට ලක් වූ අංශුවක්, පොළොවේ O නම් ලක්ෂ්‍යයේ සිට V ප්‍රවේගයක් ඇති වී නිරයට α කෝණයකින් ප්‍රක්ෂේපණය කැරෙන්නේ එකක ස්කන්ධයට ප්‍රවේගයේ $-k$ ගුණයට සමාන ප්‍රතිරෝධයක් සහිත මාධ්‍යයක් තුළ ය; මෙහි $k > 0$ වේ. t වේලාවේ දී x අංශුව, y උසකින් වෙයි නම්,

$$\frac{dy}{dt} + ky = -g$$

යන වලිකයේ සමීකරණය ලබා ගන්න; මෙහි $q = \frac{dy}{dt}$.

$$y = \left(\frac{g}{k^2} + \frac{V \sin \alpha}{k} \right) (1 - e^{-kt}) - \frac{gt}{k}$$

බව ද පෙන්වන්න.

අංශුව t_0 වේලාවේ දී එහි උසරීම උසට එළඹෙන්නේ යැයි ද සියාසර කාලය T යැයි ද සිතමු. එවිට,

$$\frac{kT}{1 - e^{-kT}} = e^{kt_0}$$

බව පෙන්වා, $T > 2t_0$ බව අපෝහනය කරන්න.

4. (අ) $2d$ දුරක සරතරයකින් පිහිටි සමාන්තර ඉදිරි දිශයේ ගෙන යන ඉදිරිදිගට සමාන්තර ව ගලා බසියි. ඉදිරි දිශයේ දිශාවේ වේගය ගුණ වන අතර ගත මුදලට යන් ම වේගය u වන තෙක් ඒකාකාර ලෙස වැඩි වෙයි. ජලයට සාපේක්ෂ ව පිහිනුම්කරුවකුගේ වේගය $2u$ ය. ඉදිරිදිගට ලම්බ වේදාවක් මස්සේ තරයට එක එල්ලේ ම ගත කරණය කරන පරිදි ඔහු පිහිනා යයි. පිහිනුම්කරු ඔහුට ආසන්න ඉදිරි සිට x දුරකින් පිහිටි වට දිශාවේ ප්‍රවේගය යොයන්න. ප්‍රවේග ප්‍රිකෝණය ද ලැබෙන්න.

ඒ නැගී,

$$\left(\frac{dx}{dt} \right)^2 = \frac{u^2}{d^2} (4d^2 - x^2)$$

බව පෙන්වන්න. මෙම වේගය සමීකරණය අනුකලනය කර, පිහිනුම්කරු

$$\frac{\pi d}{3u}$$

කාලයේ දී ගත කරණය කරන බව අපෝහනය කරන්න.

- (ආ) 0.6 m විෂ්කම්භයෙන් යුත් රෝදයක් කක්තරයකට වේඩියන් 0.7 ක ඒකාකාර කෝණික ප්‍රවේගයෙන් නිරන්තරව දිගේ පෙරළෙයි. ඕනෑ ම වේලාවක දී රෝදයේ නිරන්තර විෂ්කම්භයේ අන්තර්ල පිහිටි ලක්ෂ්‍යවල ප්‍රවේග ප්‍රලම්බ බව පෙන්වා එම ප්‍රවේගවල විශාලත්ව පෙන්වන්න.

5. M ස්කන්ධයෙන් ද h උසින් ද α ($< \frac{\pi}{2}$) ආනතියෙන් ද යුත් කුකුළුකයකට, ආරෝහකයක (මෙසාවලික) විශාල සුමට නිරන්තර ක්ෂීණ මත, එහි දරයට ලම්බ දිශාවක් මස්සේ වලනය වීමට නිදහස ඇත. ආරෝහකය a නියත කවරණයෙන් ඉහළ නැගී. kM ($k \geq 1$) ස්කන්ධයෙන් යුත් අංශුවක්, කුකුළුකයේ පහළ දරයෙන් ආරම්භ කර එහි මුහුණත දිගේ ඉහළට ප්‍රක්ෂේපණය කැරෙන්නේ V ප්‍රවේගයෙනි. අංශුවේ වලිකය පිදුවන්නේ කුකුළුකයේ ආනත මුහුණතේ වැඩිතම ඔදුම් වේදාව මස්සේ යැයි උපකල්පනය කරමින්, ඕනෑ ම වේලාවක දී කුකුළුකයේ අංශුවක් අතර R ප්‍රතික්‍රියාව

$$R = \frac{kM(g+a) \cos \alpha}{1 + k \sin^2 \alpha}$$

යන්නෙන් ලැබෙන බව පෙන්වන්න.

$$V > \left[\frac{2(1+k)(g+a)h}{1+k \sin^2 \alpha} \right]^{\frac{1}{2}}$$

නම් අංශුව ප්‍රක්ෂේපණ ලක්ෂ්‍යයට ආසන්න පැමිණෙන්නේ නැති බව සාධනය කරන්න. ඕනෑ ම වේලාවක දී, කුකුළුකයේ, ආරෝහකයේ ක්ෂීණ අතර ප්‍රතික්‍රියාව ක්ෂණික ද?

6. යතුරු පැදියක් H kW නියත ශීඝ්‍රතාවකින් කාර්ය කරයි. පදවන්නාට, සමකල බිමේ 20 m s^{-1} කින් ද සිරස සමඟ $\frac{H}{3}$ කෝණයක් සාදන කන්දක් ඉහළට 10 m s^{-1} කින් ද එම කන්ද පහළට 50 m s^{-1} කින් ද යතුරු පැදිය පදවන්නට පුළුවන. පදවන්නාගේ යතුරු පැදියේ මුළු ස්කන්ධය $2M$ kg ය. යතුරු පැදියේ වේගය $u \text{ m s}^{-1}$ වී එම වලිකයට ප්‍රතිරෝධයේ විශාලත්වය, $R = a + bu + cu^2$ kg wt යන්නෙන් දෙනු ලැබේ; මෙහි a, b, c යනු නියතයි.

$$a = \frac{51H - 7M}{3}, \quad b = \frac{3M - 16H}{20} \quad \text{සහ} \quad c = \frac{6H - M}{600} \quad \text{වෙ පෙන්වන්න.}$$

$$H \geq \frac{5(\sqrt{2} - 1)}{12} M \quad \text{වෙ අපේක්ෂා කරන්න.}$$

7. අංශුවක් u ප්‍රවේගයෙන් සිරස්ව α ආනතියක් ඇති තලයක් මත වූ O ලක්ෂ්‍යයකින් ප්‍රක්ෂේපණය කැරෙයි; ප්‍රක්ෂේපණ දිශාව වැඩිකම බැඳුම් c වූ රේඛාව සමඟ β කෝණයක් සාදයි. මෙහි $0 < \alpha + \beta < \frac{\pi}{2}$. වලිකය සිදුවන්නේ ගුරුත්වය යටතේ වැඩිකම බැඳුම් රේඛාව සහිත සිරස් තලයක ය. අංශුවේ පළමු වැනි ගැටුම තලයට අභිලම්බ ලෙස, O සිට d දුරකින් වූ P ලක්ෂ්‍යයක දී සිදුවේ. නම්,

$$(i) \beta = \tan^{-1} \left(\frac{1}{2} \cot \alpha \right) \quad \text{වෙත්} \quad (ii) d = \frac{2u^2}{g} \frac{\sin \alpha}{1 + 3 \sin^2 \alpha} \quad \text{වෙත්}$$

පෙන්වන්න.

ඒ නමින්, දී සිටින $|u|$ අගයක් සඳහා d හි විශාලතම අගය $\frac{u^2}{g\sqrt{3}}$ වෙත්, $\alpha = \sin^{-1} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right)$ වී එම අගය ලැබෙන වෙත් පෙන්වන්න.

තවද $PQ = e^2 d$ වන පරිදි P හි O හි අතර පිහිටි Q ලක්ෂ්‍යයක දී දෙවැනි ගැටුම සිදු වන වෙත් මෙම ගැටුමට මොහොතකට පෙර අංශුවේ ප්‍රවේගය O හි මුල් ප්‍රක්ෂේපණ දිශාවට සමාන්තර වී eu වෙත් පෙන්වන්න. මෙහි e යනු ප්‍රකාශනි සංගුණකය යි.

8. I ආවේගයක් හේතු කොට ගෙන ප්‍රවේගය u සිට v තෙක් වෙනස් වන අංශුවක වාලක ශක්ති විපර්යාසය සඳහා $\frac{1}{2} I \cdot (u + v)$ ප්‍රකාශනය ලබා ගන්න.

එක එකක් M ස්කන්ධයෙන් ද a අරයෙන් ද යුත් සමාන ගෝල දෙකක්, එක එකක දිග l වූ සමඟ, සිරස්, අවිකනා ඝනකු දෙකක් මගින්, එකම සිරස් මට්ටමේ වූ ද $2a$ දුරක පරතරයකින් වූ ද A, B අවල ලක්ෂ්‍ය දෙකකින් එල්ලා ඇත්තේ ගෝල දෙක ස්පර්ශ වෙමින් ඒවායේ කේන්ද්‍ර එකම මට්ටමේ පිහිටන පරිදි ය.

ස්කන්ධය m ($< 2M$) ද අරය $(\sqrt{2} - 1)a$ ද වූ කුඩා ගෝලයක් එහි කේන්ද්‍රය AB හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යයේ පිහිටන පරිදි රඳවා තිබේදිකාලීනව සිට සෙමින් මුදු හරිනු ලැබේ. එය, අනෙක් ගෝල දෙකේ සමගාමී ලෙස වැටීමේ ගැටෙන මොහොතේ දී ගෝල කුහේ කේන්ද්‍ර, සිරස් තලයක වූ සෘජුකෝණී සම්බන්ධතා ප්‍රකෝණයක නිර්වචන පිහිටන පරිදි ය. M ස්කන්ධයෙන් යුත් එක් එක් ගෝලයට ලැබෙන ප්‍රවේගය

$$\frac{mu(1+e)}{2M+m}$$

වෙ පෙන්වන්න. මෙහි $u = \sqrt{2gl}$ ද e යනු ප්‍රකාශනි සංගුණකය ද වෙයි.

එක් එක් කන්කුවේ ආවේනි ආනතිය J නම්, ගැටුම නිසා සිදුවන වාලක ශක්ති හානිය

$$Ju(1-e)$$

වෙ පෙන්වන්න.

ඒ නමින් හෝ අන් අයුරකින් හෝ, m ස්කන්ධයෙන් යුත් අංශුව ගැටුමේ දී ක්ෂණික වශයෙන් නිර්වචනවට පෑමේණයී නම් පද්ධතියේ වාලක ශක්ති හානිය

$$mgl \left(1 - \frac{m}{2M} \right)$$

වෙ පෙන්වන්න.

9. සුමට අවල කප්පියක් උඩින් යන යුතු අවිභ්‍යාස තත්ත්වයක් ස්කන්ධය M වූ බාලදියක් එල්ලා තිබේ. තත්ත්වයේ අනෙක් කෙළවරේ සමාන M ස්කන්ධයෙන් යුත් ප්‍රතිරෝධකයක් දරා සිටියි. ස්කන්ධය m වූ චිද්‍රභූ ඛෝලයක් u ප්‍රවේගයෙන් බාලදියේ පැහැපි පතුලේ ගැටෙන පරිදි පිරිස් ලෙස හෙළනු ලැබේ. චිද්‍රභූ ඛෝලයක් බාලදියක් අතර ප්‍රකාශනි සංගුණකය e නම් පළමුවැනි ගැටීමත් දෙවැනි ගැටීමත් අතර හෙට් යන කාලය α විය.

තවද, පළමුවැනි ගැටීමේ සිට

$$T = \frac{2eu}{(1-e)g}$$

මුළු කාලයකට පසු ගැටීම් සියල්ලම නවතින බවත් T කාල ප්‍රාන්තරය තුළ දී ප්‍රතිරෝධකය කප්පියට ගො නොවන්නේ නම් මේ කාල ප්‍රාන්තරය තුළ ප්‍රතිරෝධකයේ මධ්‍යක වේගය $\frac{mu}{2M+m}$ බවත් පෙන්වන්න.

10. ස්ථානානුකූල දිග l ද, ප්‍රකාශ්වතා සංගුණකය mg ද වූ යුතු ප්‍රකාශ්වත තත්ත්වයක එක් කෙළවරක් O අවල ලක්ෂ්‍යයකටත් අනෙක් කෙළවර ස්කන්ධය m වූ අංශුවකටත් ඇඳා තිබේ. අංශුව, $t = 0$ වේලාවේ දී O හි සිට $\sqrt{(n^2+2)gl}$ ප්‍රවේගයකින් පිරිස් ලෙස උඩු අතට ප්‍රක්ෂේපණය කැරෙයි; මෙහි n යනු ධන නියතයකි. kl යනු අංශුව ගො වන උපරිම උස ද k යනු 1 ට වැඩි නියතයක් ද වීම

- (i) $0 \leq y \leq l$ ද
(ii) $l < y \leq kl$ ද

යන අවස්ථා වෙන් කොට දක්වමින්, අංශුව සඳහා O ට ඉහළින් අංශුවේ $y(t)$ උස ඇතුළත් වලිතයේ සමීකරණය, අවකල සමීකරණයක් ලෙස ලියා දක්වන්න.

ඉහත (ii) අවස්ථාවේ දී,

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{l}} \quad \text{ද} \quad t \geq t_0 \quad \text{ද} \quad \text{විට} \quad y(t) = A \cos \omega(t-t_0) + B \sin \omega(t-t_0)$$

යන්නේත් ඉහත අවකල සමීකරණය සපුරාලන බව සනාථනය කර A හා B නියත සොයන්න.

අංශුව, $\left[\sqrt{n^2+2} - n + \tan^{-1} n \right] \sqrt{\frac{l}{g}}$ වේලාවකට පසු පහළ බැසීමට පටන් ගන්නා බව පෙන්වා k හි අගය සොයන්න.

11. a දිගැති සැහැල්ලු දණ්ඩකට, අවල A කෙළවරක් වටා නිදහස් ලෙස භ්‍රමණයට භාජිය. එහි අනෙක් B කෙළවරට m බරැති අංශුවක් ගැටී යයි. B කෙළවර a දිගින් යුත් අවිභ්‍යාස තත්ත්වයක් මගින් A හරහා යන අවල, සුමට, නිරස් සම්පීඩන සර්පණය විය හැකි m බරැති කුඩා C මුදුරකට යා කර තිබේ. ආරම්භයේ දී A, B, C එකවරම වන අතර AC හි දිග $2a$ වේ. පද්ධතිය නිශ්චලතාවේ සිට මුදුර නැවතු ලැබේ. t වේලාවේ දී $\widehat{CAB} = \theta$ නම්

$$\left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 = \frac{2g}{a} \frac{\sin \theta}{1 + 4 \sin^2 \theta}$$

බව පෙන්වන්න.

තත්ත්වයේ T ආතතිය, θ හි මූලයක් ලෙස සොයා, දණ්ඩේ ආතතියට තත්ත්වයේ ආනතිය 3:2 බව පෙන්වන්න.

12. සමාන්තර අක්ෂ ප්‍රවේගය ප්‍රකාශ කරන්න. පාදයක් $2a$ දිග සමපාද ත්‍රිකෝණයක හැඩයෙන් යුත් m ස්කන්ධය ඇති ඒකාකාර ආස්තරයක එක් දරයක් වටා අවස්ථිති සුරණය $\frac{1}{2} ma^2$ බව දී තිබේ. ප්‍රතිචිරුද්ධ මුල්ල හරහා යන සමාන්තර අක්ෂයක් වටා ආස්තරයේ අවස්ථිති සුරණය සොයන්න.

ස්කන්ධය M ද පාදයක් $2a$ ද වූ ඒකාකාර සවිධි ඔවු ආස්තරයක එක් දරයක් වටා අවස්ථිති සුරණය $\frac{22}{6} Ma^2$ බව අපෝහනය කරන්න.

දරයක් සමග සම්පාත වන නිරස් අක්ෂයක් වටා භ්‍රමණය වීමට නිදහස ඇති ඔවු ආස්තරය තලය පිරිස් ව තිබෙන සේ නිශ්චලතාවේ එල්ලෙයි. ආස්තරයේ තලයට ලම්බ ව u වේගයෙන් වලනය වන λM ස්කන්ධයෙන් යුත් දණ්ඩයක් ආස්තරයේ කේන්ද්‍රයේ වැදී එයට කා වදීයි. ක්ෂණික ව උණ්ඩයේ වේගය $\frac{u}{3}$ ට උනනය වේ. නම්, $\lambda = \frac{22}{36}$ බවත් පද්ධතියෙහි රඳවාගන්නේ අංශුවේ වාලක ගතිකයෙන් තුනෙන් එකක් පමණක් බවත් පෙන්වන්න.