

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව/Department of Examinations, Sri Lanka

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, අගෝස්තු 1991  
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 1991

(01) ඉද්ධ ගණිතය II  
(01) PURE MATHEMATICS II


01	
S	II

පැය තුනයි / Three hours  
ප්‍රශ්න හයකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.

1.  $D, E, F$  යනු  $ABC$  ත්‍රිකෝණයෙහි පිළිවෙලින්  $BC, CA, AB$  පාද මත පිහිටි ලක්ෂ්‍ය වන විට  $AD, BE, CF$  රේඛා එකලක්ෂ්‍ය වීම සඳහා අවශ්‍යතාව සඳහන් කර එය සාධනය කරන්න.

ඉහත අවශ්‍යතාව සැපිරේ නම්,  $DA, EB$  සහ  $FC$  ට සමාන්තර ව පිළිවෙලින්  $B'C', C'A'$  සහ  $A'B'$  ඇඳීමෙන්  $A'B'C'$  නම් වෙනත් ත්‍රිකෝණයක් අඳිනු ලැබේ.  $BC$  ට සමාන්තරව  $A'$  හරහා ඇඳී රේඛාව  $X$  හිදී  $B'C'$  හමුවන අතර  $CA$  ට සමාන්තරව  $B'$  හරහා ඇඳී රේඛාව  $Y$  හිදී  $C'A'$  හමුවේ.  $A'X$  සහ  $B'Y$  රේඛා  $G$  හිදී ඡේදනය වේ.  $C'G$  සහ  $BA$  සමාන්තර බව පෙන්වන්න.

2.



$ABCD A'B'C'D'$  යනු දරවල දිග  $a$  වූ ඝනකයකි.  $P$  වූ කලී  $BP = \lambda PB'$  වන පරිදි  $BB'$  දරය මත පිහිටි ලක්ෂ්‍යයකි.  $AD'$  රේඛාව සහ  $P$  ලක්ෂ්‍යය අඩංගු කලය  $B'C'$  දරය  $Q$  හිදී හමුවේ.  $C'Q = \lambda QB'$  බව පෙන්වන්න.

- තව ද,  $a$  සහ  $\lambda$  ඇසුරෙන්  
(අ)  $PQ$  හි දිග, (ආ)  $\cos \angle APQ$ , (ඇ)  $APQD'$  හි වර්ගඵලය,  
සොයන්න.

3.  $ax + by + c = 0$  රේඛාව මත  $(x_1, y_1)$  ලක්ෂ්‍යයේ ප්‍රතිවිම්බය සොයන්න.

$ABCD$  යනු  $B \equiv (1, 0)$  සහ  $AB, AC$  හි සමීකරණ පිළිවෙලින්  $y - x + 1 = 0$  සහ  $y - 3x = 0$  වන සේ වූ රූපමයකි.  $DA, CD$  සහ  $BC$  රේඛාවල සමීකරණ සොයන්න.

තව ද,  $ABCD$  රූපමයයේ වර්ගඵලය ද සොයන්න.

4.  $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$  වෘත්තය මත පිහිටි  $Q_1, Q_2$  ලක්ෂ්‍ය හරහා වූ ස්පර්ශක  $P_0 \equiv (x_0, y_0)$  හිදී හමුවේ.  $P_0$  ලක්ෂ්‍යයෙහි  $Q_1Q_2$  ස්පර්ශ ඡායයෙහි සමීකරණය

$$x x_0 + y y_0 + g(x + x_0) + f(y + y_0) + c = 0$$

බව පෙන්වන්න.

$$x^2 + y^2 + 6y + 5 = 0 \text{ සහ } x^2 + y^2 + 2x + 8y + 5 = 0$$

වෘත්තවලට අනුබද්ධව  $(1, -2)$  ලක්ෂ්‍යයේ ස්පර්ශ ඡායා සමාන වන බව සාධනය කරන්න.

තව ද, ඉහත දක්වූ වෘත්තවලට අනුබද්ධව ස්පර්ශ ඡායා එකම වන පරිදි වෙනත් ලක්ෂ්‍යයක් තිබෙන බව පෙන්වා එහි ඛණ්ඩාංක සොයන්න.

5. (i)  $O$  මූලයේ සිට දී ඇති ( $O$  හරහා නොයන)  $l$  සරල රේඛාවකට ඇදී ලම්බය, ආරම්භක රේඛාව සමඟ  $\alpha$  කෝණයක් සාදන අතර එහි දිග  $d$  වේ.  $l$  හි සමීකරණය  $r = d \sec(\theta - \alpha)$  බව පෙන්වන්න. ඒ නමින්,  $r \cos \theta = 3$  සහ  $r \sin \theta = 4$  සමීකරණවලින් සරල රේඛා දෙකක් නිරූපනය කෙරෙන බව පෙන්වා

- (අ) ඒවා අතර කෝණය ද,
- (ආ) ඡේදන ලක්ෂ්‍යයේ මූලික ඛණ්ඩාංක ද සොයන්න.

(ii) එකම රූප සටහනෙහි,

(අ)  $\frac{x^2}{4} + y^2 - 1 = 0,$

(ආ)  $x^2 - 4y = 0,$

(ආ)  $y - x + 1 = 0$

වක්‍රවල කටුසටහන් අඳින්න.

$\frac{x^2}{4} + y^2 - 1 \leq 0, x^2 - 4y \geq 0$  සහ  $y - x + 1 \geq 0$  අසමානතා සපුරාලන්නාවූ,  $x - y$  කලපය  $R$  වෙත සටහන් කරන්න.  $R$  තුළ  $x^2 + y^2$  හි වැඩිම අගය ලබා ගන්න.

6.  $y^2 = 4ax$  පරාවලයට  $(at_1^2, 2at_1)$  සහ  $(at_2^2, 2at_2)$  ලක්ෂ්‍යවල දී ඇඳි ස්පර්ශකවල ඡේදන ලක්ෂ්‍යය  $\{ at_1t_2, a(t_1 + t_2) \}$  බව පෙන්වන්න.

$(at^2, 2at)$  ලක්ෂ්‍යයෙහි ස්පර්ශකය  $P \equiv (aT^2, 2aT)$  ලක්ෂ්‍යය හරහා වූ ස්පර්ශකය සමඟ  $\alpha$  කෝණයක් සාදයි නම්

$$t^2(1 - T^2 \tan^2 \alpha) - 2Tt \sec^2 \alpha + T^2 - \tan^2 \alpha = 0$$

සමීකරණයෙන්  $t$  ගෙන දෙන බව පෙන්වන්න.

එවැනි ස්පර්ශක දෙකක් පවතින බව අපෝහනය කර, ඒවායේ  $Q$  ඡේදන ලක්ෂ්‍යයේ ඛණ්ඩාංක,  $T$  සහ  $\alpha$  ඇසුරෙන් සොයන්න.

$PQ$  හි සමීකරණය

$$y - 2aT = -\frac{2T}{1 - T^2} (x - aT^2)$$

බව ද පරාවලය මත  $P$  වලනය වන විට එය අවල ලක්ෂ්‍යයක් හරහා යන බව ද පෙන්වන්න.

7.  $P \equiv \left\{ \frac{a(1-t^2)}{1+t^2}, \frac{2bt}{1+t^2} \right\}$  ලක්ෂ්‍යය  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ඉලිප්සය මත

පිහිටන බව පෙන්වන්න.

$P$  හි දී ඉලිප්සයට ඇඳි ස්පර්ශකයේ සමීකරණය

$$b(1-t^2)x + 2aty = (1+t^2)ab$$

බව ද පෙන්වන්න.

ඉලිප්සය මත වූ  $Q$  ලක්ෂ්‍යයේ ඛණ්ඩාංක

$$\left\{ \frac{-2at}{1+t^2}, \frac{b(1-t^2)}{1+t^2} \right\}$$
 වේ.  $Q$  හි දී ස්පර්ශකයේ සමීකරණය ලියන්න.

තව ද,  $t$  විචලනය වන විට, (අ)  $OP^2 + OQ^2$  (ආ)  $OPQ$  ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය

නියතව පවතින බව ද පෙන්වන්න; මෙහි  $O$  යනු මූල ලක්ෂ්‍යයයි.

$P$  සහ  $Q$  හිදී ඉලිප්සයට ඇඳි ස්පර්ශක එකිනෙකට  $T$  හිදී හමුවේ.  $t$  විචලනය වන විට,  $T$  ලක්ෂ්‍යය වෙනස් ඉලිප්සයක් මත පිහිටන බව ද පෙන්වන්න.

8.  $x^2 - y^2 = a^2$  බහුවලයේ විකේන්ද්‍රිකතාව සොයා එහි,  $S, S'$  නාභිවල ඛණ්ඩාංක ලියන්න.

තව ද,  $S'$  සහ  $S''$  ට අනුරූප නියාමකයන්ගේ සමීකරණ ද ලියන්න.

සුදුසු පරිදි ඛණ්ඩාංක අක්ෂ කුලකයක් තෝරා ගැනීමෙන් බහුවලයේ සමීකරණය  $xy = \frac{a^2}{2}$  වලය ගත හැකි බව පෙන්වා නාභි දෙකෙහි ඛණ්ඩාංක ද අනුරූප නියාමකවල සමීකරණ ද ලියන්න.

සාමාන්‍යයෙන් බහුවලයක ස්පර්ශකත්‍රිම දෙකට  $S$  නාභියේ සිට ඇඳී ලම්බවල අඩි  $L$  සහ  $M$  වේ.  $LM$  යනු  $S$  ට අනුරූප වූ නියාමකය බව පෙන්වන්න.

$SL$  රේඛාව  $N$  හි දී බහුවලය හමුවේ නම්,  $N$  හිදී බහුවලයට ඇඳි ස්පර්ශකය  $M$  හරහා යන බව පෙන්වන්න.

5. (i)  $O$  මූලයේ සිට දී ඇති  $O$  භරණ භෝගයක  $l$  භරල ඉර්බාලකට ඇදී ලම්බය, ආරම්භක ඉර්බාල සමඟ  $\alpha$  කෝණයක් සාදන අතර එහි දිග  $d$  වේ.  $l$  හි සමීකරණය  $r = d \sec(\theta - \alpha)$  බව පෙන්වන්න. එ නිසින්,  $r \cos \theta = 3$  සහ  $r \sin \theta = 4$  සමීකරණවලින් භරල ඉර්බා දෙකක් නිරූපනය කෙරෙන බව පෙන්ව.

(අ) ඒවා අතර කෝණය ද,

(ආ) ඡේදන ලක්ෂ්‍යයේ මූලික බිඳ්ඩාංක ද පෙන්වන්න.

- (ii) එකම රූප සටහනෙහි,

(අ)  $\frac{x^2}{4} + y^2 - 1 = 0,$

(ආ)  $x^2 - 4y = 0,$

(ඈ)  $y - x + 1 = 0$

වක්‍රවල කටුසටහන් අඳින්න.

$\frac{x^2}{4} + y^2 - 1 \leq 0, x^2 - 4y \geq 0$  සහ  $y - x + 1 \geq 0$  අසමානතා සපුරාලන්නාවූ,  $x - y$  කලයේ  $R$  වෙතද සටහන් කරන්න.  $R$  කුළු  $x^2 + y^2$  හි වැඩිතම අගය ලබා ගන්න.

6.  $y^2 = 4ax$  පරාවලයට  $(at_1^2, 2at_1)$  සහ  $(at_2^2, 2at_2)$  ලක්ෂ්‍යවල දී ඇඳී ස්පර්ශකවල ඡේදන ලක්ෂ්‍යය  $(at_1t_2, a(t_1 + t_2))$  බව පෙන්වන්න.

$(at^2, 2at)$  ලක්ෂ්‍යයෙහි ස්පර්ශකය  $P \equiv (aT^2, 2aT)$  ලක්ෂ්‍යය භරණ වූ ස්පර්ශකය සමඟ  $\alpha$  කෝණයක් සාදයි නම්

$$t^2(1 - T^2 \tan^2 \alpha) - 2Tt \sec^2 \alpha + T^2 - \tan^2 \alpha = 0$$

සමීකරණයෙන්  $t$  ගෙන දෙන බව පෙන්වන්න.

එවැනි ස්පර්ශක දෙකක් පවතින බව අපෝහනය කර, ඒවායේ  $Q$  ඡේදන ලක්ෂ්‍යයේ බිඳ්ඩාංක,  $T$  සහ  $\alpha$  ඇසුරෙන් පෙන්වන්න.

$PQ$  හි සමීකරණය

$$y - 2aT = -\frac{2T}{1 - T^2} (x - aT^2)$$

බව ද පරාවලය මත  $P$  වලනය වන විට එය අවල ලක්ෂ්‍යයක් භරණ යන බව ද පෙන්වන්න.

7.  $P \equiv \left\{ \frac{a(1-t^2)}{1+t^2}, \frac{2bt}{1+t^2} \right\}$  ලක්ෂ්‍යය  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ඉලිප්සය මත

පිහිටන බව පෙන්වන්න.

$P$  හි දී ඉලිප්සයට ඇඳී ස්පර්ශකයේ සමීකරණය

$$b(1-t^2)x + 2aty = (1+t^2)ab$$

බව ද පෙන්වන්න.

ඉලිප්සය මත වූ  $Q$  ලක්ෂ්‍යයේ බිඳ්ඩාංක

$$\left\{ \frac{-2at}{1+t^2}, \frac{b(1-t^2)}{1+t^2} \right\}$$
 වෙයි.  $Q$  හි දී ස්පර්ශකයේ සමීකරණය ලියන්න.

තවද,  $t$  විචලනය වන විට, (අ)  $OP^2 + OQ^2$  (ආ)  $OPQ$  ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය

නියතව පවතින බව ද පෙන්වන්න; මෙහි  $O$  යනු මූල ලක්ෂ්‍යය යි.

$P$  සහ  $Q$  හිදී ඉලිප්සයට ඇඳී ස්පර්ශක එකිනෙකට  $T$  හිදී හමුවේ.  $t$  විචලනය වන විට,  $T$  ලක්ෂ්‍යය වෙනස් ඉලිප්සයක් මත පිහිටන බව ද පෙන්වන්න.

8.  $x^2 - y^2 = a^2$  බහුවලයේ විකේන්ද්‍රිකතාව පෙන්වා එහි,  $S, S'$  නාභිවල බිඳ්ඩාංක ලියන්න.

තවද,  $S$  සහ  $S'$  ට අනුරූප නියාමකයන්ගේ සමීකරණ ද ලියන්න.

සුදුසු පරිදි බිඳ්ඩාංක අක්ෂ කලකයක් තෝරා ගැනීමෙන් බහුවලයේ සමීකරණය  $xy = \frac{a^2}{2}$  ලෙස ගත හැකි බව පෙන්වා නාභි දෙකෙහි බිඳ්ඩාංක ද අනුරූප නියාමකවල සමීකරණ ද ලියන්න.

සෘජුකෝණීය බහුවලයක ස්පර්ශකත්වය පෙන්වා  $S$  නාභියේ සිට ඇඳී ලම්බවල අඩි  $L$  සහ  $M$  වෙයි.  $LM$  යනු  $S$  ට අනුරූප වූ නියාමකය බව පෙන්වන්න.

$SL$  ඉර්බාල  $N$  හි දී බහුවලය හමුවේ නම්,  $N$  හිදී බහුවලයට ඇඳී ස්පර්ශකය  $M$  භරණ යන බව පෙන්වන්න.